



PROVINCIA DI PISA



MARITTIMO - IT FR - MARITIME
TOSCANA - LIGURIA - SARDEGNA - CORSE



PECORA POMARANCINA: MORFOLOGIA E BIOMETRIE



Foto: C. Lotti

La Pomarancina viene descritta dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa., 2012) come una razza di taglia medio - grande.

Testa: leggera, sprovvista di corna, con profilo fronto - nasale leggermente montonino, più marcato nei maschi. Non si riscontra la presenza di corna sui soggetti esaminati, tra l'altro considerate da molti allevatori un difetto da eliminare; l' 11,54% mostrano comunque degli abbozzi di queste.

Il portamento delle orecchie è pendente nel 64,46% dei capi e orizzontale nel 35,9% degli ovini, solo un'irrilevante percentuale (0,64%) presenta orecchie con portamento eretto e ciò è perfettamente congruo con i caratteri tipici della razza.


Le tettole, appendici cutanee collocati tra mandibola e collo, sono normalmente assenti, anche tale carattere è presente nel 6,41% dei soggetti.

Vello: prevalentemente bianco, tuttavia nel 3,21% dei casi è macchiato e nell'1,28% nero. Esso copre il collo, ma non è presente né sulla testa, né sugli arti, sui quali arriva fino al gomito. La lana è caratterizzata, per la maggior parte dei casi, da boccioli semiaperti, anziché aperti come riportato dai caratteri tipici.

Bibliografia: ARSIA, 2007. Scheda di razza: Pomarancina. In: Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio zootecnico della regione Toscana con riferimento alle seguenti razze; Bovini: Calvana, Garfagnina e Pontremolese; Ovini: Garfagnina bianca, Pomarancina e Zerasca. Asso.Na.Pa., 2010, Campea C., 2007-2008. Salvaguardia e valorizzazione della razza ovina Pomarancina: caratterizzazione morfologica e produttiva. Corso di Laurea Quinquennale in Scienze Forestali ed ambientali Dipartimento di Scienze Zootecniche. Tesi di Laurea. Casu S., Carta R., Ruda G., 1983. Morphologie de la mamelle et aptitude à la traite mécanique de la brebis Sarde. III Symposium International de ordeño mecánico de pequeños rumiantes. Valladolid (España), 592-603. Diaz Rivera, P., Perez, T.C., Bozzi, R. 2002. Risorse Genetiche Animali Autoctone della Toscana. ARSIA. FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI, 1961. Gli allevamenti italiani. Ovini. Ed. REDA, Roma. SARGENTINI C., DIAZ RIVERA, P., GIORGETTI, A., BOZZI, R., 2006. Pomarancina. AA.VV. In: Risorse Genetiche Animali Autoctone Della Toscana. ARSIA, Firenze. 169 - 173.

Mammella: nella maggioranza delle fattrici questa è simmetrica.


La posizione dei capezzoli sulla mammella, secondo la scala proposta da Casu et al. (1983), è inclinata nella maggior parte delle pecore, risultando tendenzialmente adatta alla mungitura meccanica.



La razza è, comunque, inserita dall'ASSO.NA.PA. tra gli ovini ad attitudine prevalentemente da carne e la produzione di latte è utilizzata soprattutto per l'alimentazione dell'agnello.

Misure zoometriche effettuate:

- ▲ larghezza della testa
- ▲ lunghezza dell'orecchio
- ▲ lunghezza arco nasale
- ▲ lunghezza corda nasale
- ▲ altezza al garrese:
 - altezza alla croce
- ▲ lunghezza della groppa
- ▲ larghezza bischiatica
- ▲ larghezza bitrocantaria
- ▲ larghezza bisiliaca
- ▲ altezza del torace
- ▲ larghezza del torace
- ▲ circonferenza del torace
- ▲ lunghezza del tronco
- ▲ circonferenza stinchi



Fonte: Campea, C.

Principali parametri biometrici:

| | ♂ | ♀ |
|---------------------------|------|------|
| Peso vivo (kg) | 68,7 | 58,1 |
| Altezza garrese (cm) | 74,8 | 70,5 |
| Altezza croce | 78,0 | 73,3 |
| Lunghezza tronco (cm) | 84,0 | 79,0 |
| Circonferenza torace (cm) | 97,2 | 94,7 |

